

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Первый заместитель Министра

Д.Л. Пиневич

«16» августа 2018 г.

Регистрационный №001–0118

МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ:

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,

ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии»

АВТОРЫ:

Д-р мед. наук, доцент Н. В. Матиевская, канд. мед. наук А. Е. Гончаров,
И. О. Токунова

Гродно, 2018

В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен метод прогнозирования неблагоприятного течения ВИЧ-инфекции, основанный на определении тропизма ВИЧ, который может быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на лечение ВИЧ-инфекции.

Инструкция предназначена для врачей-инфекционистов, врачей-лаборантов, иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь ВИЧ-инфицированным пациентам в амбулаторных и (или) стационарных условиях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Установленный диагноз ВИЧ-инфекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствуют.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Медицинская техника:

- Комплект оборудования с возможностью проведения сиквенс-анализа генома вируса иммунодефицита человека.

Изделия медицинского назначения:

- наконечники пластиковые с аэрозольным барьером объемом 1-5 мл;
- наконечники пластиковые с аэрозольным барьером объемом 0,01-0,1 мл;
- наконечники пластиковые с аэрозольным барьером объемом 0,1-1,0 мл;
- наконечники пластиковые с аэрозольным барьером объемом 0,5-10 мл;
- вакутайнеры с ЭДТА;
- набор реагентов для определения тропизма ВИЧ, согласно инструкции производителя.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Забор венозной крови, получение плазмы крови или выделение лимфоцитов крови, транспортировка и хранение материала осуществляется общепринятыми методами. Определение тропизма ВИЧ осуществляется генотипическим методом путем определения величины FPR (false positive rate), при величине показателя более 20% образец считается R5-тропным, при величине, равной 20% или менее, – не R5-тропным.

Интерпретация данных

Установление не R5-тропного варианта ВИЧ позволяет прогнозировать неблагоприятный исход ВИЧ-инфекции в виде формирования тяжелых оппортунистических инфекций с неблагоприятным исходом.

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЕТОДА
И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

Проблема	Возможная причина	Пути устранения
Невозможно выделить РНК ВИЧ	<p>Неопределяемая вирусная нагрузка РНК ВИЧ (менее детектируемого уровня):</p> <p>1) пациент не получает АРТ, но находится на ранней стадии ВИЧ-инфекции;</p> <p>2) пациент получает АРТ, на фоне которой достиг вирусологического ответа на терапию</p>	<p>Использовать в качестве матрицы ДНК ВИЧ, полученную из лимфоцитов пациента по стандартной методике</p>

название

учреждения

здравоохранения

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач

201____
МП

И.О.Фамилия

А К Т

учёта практического использования инструкции по применению

1. Инструкция по применению: «Метод прогнозирования неблагоприятного течения ВИЧ-инфекции».

2. Утверждена Министерством здравоохранения Республики Беларусь 16.03.2018 № 001 – 0118.

3. Кем предложена разработка: сотрудниками кафедры инфекционных болезней УО «Гродненский государственный медицинский университет» заведующим кафедрой Н. В. Матиевской и аспирантом И. О. Токуновой, заведующим лабораторией иммунологии и клеточной биотехнологии ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии» А. Е. Гончаровым.

4. Материалы инструкции использованы для _____

5. Где внедрено: _____

подразделение и название учреждения здравоохранения

6. Результаты применения метода за период с _____

по _____
общее кол-во наблюдений «_____»
положительные «_____»
отрицательные «_____»

7. Эффективность внедрения (восстановление трудоспособности, снижение заболеваемости, рациональное использование коечного фонда, врачебных кадров и медицинской техники) _____

8. Замечания, предложения: _____

201____ Ответственные за внедрение

Должность

подпись

И.О.Фамилия

Примечание: акт о внедрении направлять по адресу:
кафедра инфекционных болезней
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
ул. Горького, 80
230009, г. Гродно